JORNADA DE RASTREO DE FAUNA SILVESTRE

Mini-cuadernillo de posibles especies a observar y encontrar sus rastros

Impartido por Jorge Ortiz González

Coordinado por Mike Pérez

¿Qué es el rastreo?

- "*Una brillante mezcla entre arte ancestral y ciencia natural. En él se fusionan profundos conocimientos sobre la naturaleza junto a una buena capacidad de observación, lo que da lugar a la posibilidad de deducir hipótesis en las que la fauna es la protagonista*". Paloma Troya y Fernando Gómez.

- Un rastro es cualquier **indicio de la actividad o presencia de fauna** que podemos percibir. Por ello, la variedad de rastros que podemos encontrar es enorme, por ejemplo: Los principales tipos de rastros son: huellas, excrementos, restos óseos, egagrópilas, restos de alimentación, pelo y plumas e indicios de actividad (encames, rascaduras, guaridas…), etc. Encontrar pruebas de la presencia de fauna, que a menudo es muy huidiza, siempre llena de ilusión.









Monte de “El Pardo”

- Es un espacio natural de casi **16.000 hectáreas** dominado por especies vegetales mediterráneas (encina, quejigo, alcornoque, jara, retama, romero, etc.). Posee un relieve suave y es atravesado por el río **Manzanares**, acompañado de vegetación de ribera como fresnos, chopos o juncos, entre otros.

- Se han citado **125** especies de aves (águila imperial, cigüeña negra, pinzón vulgar, etc.), **35** de mamíferos (gato montés, ratón de campo, tejón, etc.), **19** de reptiles (lagarto ocelado, culebra de escalera, eslizón tridáctilo, etc.) y **13** de anfibios (gallipato, sapo común, sapillo pintojo, etc.)

  - *“Se estima que en el monte de El Pardo viven 500 jabalíes, 3.600 ciervos, 4.000 gamos y 30.000 conejos.”*





Jabalí (*Sus scrofa*)



- Ungulado de mediano tamaño. Se distribuye por la mayor parte de la Península Ibérica en gran variedad de hábitats. Los machos (75-85 kg) alcanzan pesos mayores que las hembras (55-65 kg).

- Remueve el suelo con su hocico, creando hozaduras. Es omnívoro alimentándose principalmente de vegetales. El celo tiene lugar en otoño-invierno, las hembras entran en celo al alcanzar los 30 kg. El tamaño de la camada varía entre 1-8 crías.

- Forman grupos de tamaño distinto, en torno a uniones familiares. Se comunican mediante gruñidos y sonidos muy variables. Su esperanza de vida ronda los 11 años de vida pero la mayoría no supera los 3 años.

Excremento:



Huella:



Largo: 5-8cm
Ancho: 5-6 cm

Ciervo (*Cervus elaphus*)



- Ungulado de mediano-gran tamaño. Se distribuye por gran parte de la Península Ibérica exceptuando zonas de Galicia y del levante. Habita zonas de pradera próximas a bosque o matorral. Los machos (80-160 kg) alcanzan pesos mayores que las hembras (50-100 kg).

- Es herbívoro (herbáceas, frutos y arbustos). El celo ocurre entre septiembre-octubre, cuando los machos emiten un sonido llamado berrea. La madurez sexual se alcanza a los 1-2 años hembras / 2-3 años machos.

- Es un animal gregario. Los dos sexos están separados la mayor parte del año, excepto durante la época de celo. Los machos desarrollan cada año cuerna ósea que acaba en punta.

Excremento:



Huella:



Largo: 6-9m
Ancho: 6-7 cm

Gamo (*Dama dama*)



- Ungulado de mediano tamaño. El pelaje veraniego presenta motas blancas características. Ocupa numerosas áreas fragmentadas y dispersas en la Península Ibérica. Habita zonas de pradera, claros y bordes de bosque cercanos a ríos. Los machos (52-63 kg) alcanzan pesos mayores que las hembras (28-41 kg).

- Es herbívoro (herbáceas, frutos y arbustos). El celo ocurre a principios de otoño , cuando los machos emiten un sonido llamado ronca. La madurez sexual se alcanza a los 1-2 años hembras / 2-3 años machos.

- Es un animal muy gregario. Los dos sexos están separados la mayor parte del año, excepto durante la época de celo. Los machos desarrollan cada año cuerna ósea en forma de pala.

Excremento:



Huella:



Largo: 4-6cm
Ancho: 4 cm

Zorro (*Vulpes vulpes*)



- El zorro es un cánido mediano (3-14 kg) con una cola larga (70% del individuo) acabada en un mechón blanco característico. Se distribuye por toda la Península Ibérica y aparece en cualquier tipo de hábitat.

- Se alimenta principalmente de micromamíferos (ratones, musarañas, topillos…), lagomorfos (conejos y liebres), frutos y basura. Se reproduce en invierno y el tamaño de la camada varía entre 1-12 crías. Generalmente presentan actividad nocturna.

- Se comunican mediante marcaje (orina, excrementos y secreciones glandulares), vocalizaciones (hasta 28 distintas) y expresiones faciales.

Excremento:



Huella:



Largo: 5-7 cm
Ancho: 4-7 cm

Visón americano (*Neovison vison*)



- Mustélido de pequeño tamaño. Es una especie exótica invasora que compite con el visón europeo, desplazándolo. Se diferencia de esta especie ya que carece de mancha blanca en el labio superior. El pelaje suele ser oscuro . Ocupa la mitad norte de la Península Ibérica. Habita zonas de bosque y matorral junto a hábitats acuáticos. Los machos (1.200 g) alcanzan pesos mayores que las hembras (680 g).

- Su dieta es muy variable, consume desde peces, cangrejos, anfibios, aves, reptiles, etc. El celo ocurre entre febrero y abril. La madurez sexual se alcanza a los 9-10 meses.

- Es un animal solitario. Se comunican de forma olorosa (orina y heces) y visual (heces). Estas marcas las realizan a lo largo de los cursos de agua sobre rocas, salientes, bajo puentes, etc.

Excremento:



Huella:



Largo: 3 cm
Ancho: 3 cm

Nutria (*Lutra lutra*)



- Mustélido de mediano tamaño. Posee un cuerpo alargado de pelaje pardo, manos y pies palmeados y una cola plana. Ocupa medios acuáticos de casi toda la Península Ibérica excepto algunas zonas del levante.. Los machos (6-9,5 g) alcanzan pesos mayores que las hembras (4,5-6,5 g).

- Consume principalmente peces, pero también se alimenta de cangrejos, anfibios, aves, reptiles, etc. Se puede reproducir en cualquier momento del año dependiendo de la disponibilidad de presas. Las camadas son de 1-5 crías.

- Es un animal solitario exceptuando la época de celo. Se comunican mediante excrementos y marcas anales. Estas marcas las realizan a lo largo de los cursos de agua sobre rocas, salientes, bajo puentes, etc.

Excremento:



Huella:



Largo: 5,5 cm
Ancho: 5,5 cm

Otros rastros



Garduña (Martes foina)



Mapache (Procyon lotor)



Gineta (Genetta genetta)



Corzo (Capreolus capreolus)



Conejo (Oryctolagus cuniculus)



Pájaro carpintero



Cigüeña blanca



Gato doméstico

Encuéntranos

www.iberozoa.com